

**Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Schwarzwald-Baar Klinikum**

Indikationen für einen Epiduralkatheter

Allgemeinchirurgie

Eingriffsbezogen

- Laparoskopische Rektumresektion ASA > 2, (Th 10-12)
- Offene Rektumresektion (Th 10-12)
- Rektumamputation (Th 10-12)
- Pankreatektomie (Th 8-9)
- Oesophagusresektion (Th 7-9)
- Gastrektomie (Th 8-9)
- Ausgedehnte Bauchdeckenrekonstruktion (je nach Operation)
- Ausgedehnte Adhäsiolyse Th (10-11)
- Offener Hartmann – Wiederanschluss (Th 10-12)

Patientenbezogen

Bei Patienten mit relevanter Co-Morbidität (COPD, KHK, Herzinsuffizienz), die sich einem großen abdominalchirurgischen Eingriff unterziehen müssen, sollte die Anlage eines Epiduralkatheters erwogen werden.

Urologie

- Cystektomie

Lungenchirurgie

- Alle Thorakotomien (nicht: Videoassistierte Thorakoskopie)

Frauenklinik

- Wehenschmerz

Kinderchirurgie

- Trichterbrustoperation

Gefäßchirurgie

- Derzeit in Überarbeitung

Absolute Kontraindikationen

- Ablehnung durch Patienten
- Blutgerinnungsstörungen
- Infektion im Einstichbereich
- Sepsis

30.10.2013



Prof. Dr. A. Benzing