

HIV Postexpositionsprophylaxe in der Notaufnahme Wann einleiten?

N. Dehina · B.E.O. Jensen · M. Bernhard · L. Böhm

Bei bestehender Indikation:



PEP einleiten – ohne Zeitverzug!

ideal: innerhalb von 2 Stunden, max. binnen 72 Stunden

Art der Exposition:		Beschreibung	Indexperson:		
			HIV-positiv		unbekannt oder unbekannter HIV-Status
			>50 HIV-RNA-Kopien/ml oder unbehandelt oder unbekannter Behandlungsstatus	<50 HIV-RNA-Kopien/ml / wirksam behandelt	
Berufliche Exposition		(Blutende) perkutane Verletzung mit kontaminierter Injektions- oder Hohlraumnaedel oder Skalpell	Green	Yellow	Blue
		Oberflächliche Verletzung (z. B. mit chirurgischer Nadel) ohne Blutfluss	Yellow	Red	Blue
Kontakt mit Körperflüssigkeiten		Kontakt von Schleimhaut/ nicht intakter Haut mit Körperflüssigkeit mit potentiell hoher Viruskonzentration (Blut, Samenflüssigkeit, Vaginalsekret)	Yellow	Red	Blue
		Kontakt intakter Haut mit Blut oder anderer Körperflüssigkeit Jeder Kontakt (perkutan, intakt und nicht-intakte Haut, Schleimhaut) mit Körperflüssigkeit ohne Übertragungsrisiko (wie Urin, Speichel, Tränen) oder Stuhl	Red	Red	Red
Nicht-berufliche nicht-sexuelle Exposition		Gemeinsame Nutzung eines HIV-kontaminierten Injektionsbesteck i.R.v. Drogenabusus	Green	Green	Yellow
		Blutige Bissverletzung durch Person mit enorale blutenden Wunden	Green	Blue	Blue

Art der Exposition:		Beschreibung	Partner:in mit bekannter HIV-Infektion			Unbekannter Partner:in oder Partner:in mit unbekanntem HIV-Status	Partner bisexuell, Partner:in mit erhöhtem Risiko für HIV-Infektion: • aktiv iv-drogenkonsumierend, • Herkunft aus HIV-Hochprävalenzregion (Subsahara-Afrika, Karibik, Südost-Asien)
			> 1000 HIV-RNA-Kopien/ml oder unbehandelt oder unbekannter Behandlungsstatus	50-1000 HIV-RNA Kopien/ml	< 50 HIV-RNA-Kopien/ml / wirksam behandelt		
Sexuelle Exposition		Ungeschützt ^A heterosexueller Vaginal- oder Analverkehr	Green	Yellow	Red	Red	Yellow
		Ungeschützt ^A Analverkehr zwischen Männern	Green	Yellow	Red	Yellow	Yellow
		Vergewaltigung/sexualisierte Gewalt mit ungeschützt ^A Anal- oder Vaginalverkehr	Green	Yellow	Red	Yellow	Yellow
		Oralverkehr mit oder ohne Aufnahme von Sperma/ Küssen	Red	Red	Red	Red	Red

Legende: ■ Empfiehlt PEP ■ Bietet PEP an ■ PEP nicht indiziert ■ Empfehlung zur PEP abhängig von weiteren Faktoren – Expertenrat einholen ^A Ungeschützt = kein Schutz durch Kondom oder HIV-PrEP

Außerdem zu beachten:

- Blutentnahme darf Beginn der PEP nicht verzögern
- Unklarheiten? Schwangerschaft? Niereninsuffizienz → Expertenrat!
- Standard der PEP-Medikamente in der Notaufnahme vorhalten
- Ausreichend Medikamente bis zum nächsten Werktag mitgeben
- Am nächsten Werktag: Vorstellung in HIV-Schwerpunktpraxis oder Ambulanz

Weitere Details und Hinweise finden Sie im dazugehörigen Artikel:

