

Anlage und Umgang mit Kathetern zu peripheren Regionalanästhesie

(N. femoralis Katheter und Interskalenären Katheter)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

folgende Punkte wurden in der Montagsfortbildung vom 06.08.2012 beschlossen:

Die Anlage eines N. femoralis Katheters und eines interskalenären Katheters erfolgt mit

- 20 ml Scandicain 1% und
- 20 ml Naropin 0,75% (15 ml Naropin 1% und 5 ml NaCl 0,9%)

Postoperativ werden die Katheter ab dem AWR mit

- N. femoralis Katheter 12ml/h Naropin 0,2%
- Interskalenäre Katheter 6 ml/h Naropin 0,2% befahren.

Nachinjektion

- N.femoralis Katheter: 20 ml Naropin 0,3% (6 ml Naropin 1% und 14 ml NaCl 0,9%)
bis zu 2/d an den postop. Tagen
- Interskalenärer Katheter: 10 ml Naropin 0,3% (3 ml Naropin 1% und 7 ml NaCl 0,9%)

Katheterfixierung:

Perifix Catheter Fixation (kein Annähen mehr erforderlich) sobald verfügbar

Am 3. postop. Tag erfolgt die Katheterentfernung morgens **ohne** Auslassversuch, wenn zu diesem Zeitpunkt eine orale Medikamentenapplikation erfolgen kann .
(Ausnahme: Katheteranlage zur Mobilisation – individuelle Absprache)

Mit freundlichen Grüßen,

Markus Noll - Schmerztherapie

